

百特 | 腹透培训



# 课程 6.

## 了解你所服用的药物

Baxter

百特 肾科

课程 6.

## 常用药物

- 磷结合剂
- 维生素D
- 铁
- 促红细胞生成素 (EPO)



## 常用药物

### 磷结合剂

- 排除体内蓄积的磷，保持骨健康
- 进餐时服用

### 维生素D


- 肾衰竭时，活性维生素D不足，无法和钙一同发生作用，
- 保持骨骼强壮
- 服用维生素D补充不足，对保证骨骼健康和强壮非常重要

### 铁

- 铁是体内血红蛋白等的组成部分
- 空腹时服用铁剂，效果最好
- 铁剂不能与磷结合剂、牛奶或抗酸剂一起服用

### 促红细胞生成素 (EPO)

- 肾衰时，促红细胞生成素分泌减少，体内的红细胞生成减少
- 促红细胞生成素是一种药物，可以促进体内红细胞的生产



## 其他可能用到的药物

- 降压药
- 胰岛素/降糖药
- 抗生素
- 肝素

## 其他可能用到的药物

### 降压药

- 控制高血压
- 医生会根据病情给您处方药物及用量

### 胰岛素

- 保持体内血糖水平的一种糖尿病治疗药物
- 如何使用胰岛素，请根据医生的要求

### 降糖药

- 如何选择降糖药，请根据医生要求

### 抗生素

- 出现腹膜炎隧道感染或导管出口处感染时，需要使用抗生素
- 请根据医生处方及建议使用

### 肝素

- “抗凝剂”，预防或减少腹腔内的纤维蛋白凝集



## 使用指导

- 服药前仔细检查药品包装及标签
- 严格按照医生的要求服药
- 如果需要加量用药，请务必事先向医护人员咨询
- 某些药物可能需要注入腹透液袋，请严格遵循无菌操作原则



## 使用指导

- 服药前仔细检查药品包装及标签
- 严格按照医生的要求服药
- 如果需要加量用药，请务必事先向医护人员咨询
- 某些药物可能需要注入腹透液袋，请严格遵循无菌操作原则

