

商品名 甲硝唑氯化钠注射液

通用名 (如有)

适应症

为减少耐药细菌的形成及保持本品及其他抗菌药物的有效性，本品应仅用于治疗已证实或强烈怀疑由以下细菌引起的感染。

当获得培养和药敏信息时，选择或调整抗菌治疗应考虑这些信息。若无此类数据，当地流行病学和药敏模式可有助于经验选择治疗。

1、治疗厌氧菌感染

本品适用于治疗敏感厌氧菌导致的严重感染。本品治疗应联合适当的外科操作。对于需氧菌和厌氧菌混合感染，除本品外，还应使用适合用于治疗需氧菌感染的抗生素。

本品可有效治疗对克林霉素、氯霉素和青霉素耐药的脆弱拟杆菌感染。

腹腔内感染 (包括腹膜炎、腹腔内脓肿和肝脓肿)；

皮肤和皮肤软组织感染；

妇科感染 (包括子宫内膜炎、子宫肌内膜炎、输卵管卵巢脓肿和术后阴道断端感染)；

细菌性败血症；

骨和关节感染；

中枢神经系统感染 (包括脑膜炎和脑脓肿)；

下呼吸道感染 (包括肺炎、脓胸和肺脓肿)；

心内膜炎；

2、预防厌氧菌感染

术前、术中和术后预防性给予甲硝唑氯化钠注射液可降低择期结直肠手术 (污染或潜在污染) 者的术后感染发生率。应在术后 12 小时内停止预防性使用甲硝唑氯化钠注射液。如有感染体征，得标本进行培养，以鉴定致病菌，以便给予适当的治疗

(具体详见说明书)

规格

100ml: 甲硝唑 0.5g 与氯化钠 0.8g

产品图

